

# Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Darreichungsform und Stärke von MabThera® auswählen

## SUBKUTANE INJEKTION

**MabThera 1.400 mg  
NUR ZUR ANWENDUNG bei NHL\***



Rosa Flip-off Deckel

Direkt aus der Durchstechflasche entnehmen und als subkutane Injektion verabreichen



## INTRAVENÖSE INFUSION

**MabThera 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung  
MabThera 500 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung  
Zur Anwendung bei allen zugelassenen Indikationen von MabThera\***



**Mit 0,9%iger NaCl- oder 5%iger  
Glukose-Lösung verdünnen und als  
intravenöse Infusion verabreichen**



Überprüfen Sie vor der Anwendung die für MabThera SC spezifischen Verpackungscharakteristika:

Rote Beschriftung: **‘Nur zur subkutanen Anwendung’, ‘Lösung zur subkutanen Injektion’** und **‘subkutan’**

\* NHL = Non-Hodgkin Lymphom

Beachten Sie bitte für weitere Informationen die Fachinformation von MabThera oder kontaktieren Sie den zuständigen Roche Außendienstmitarbeiter.

Veröffentlicht von Roche Austria GmbH  
1211 Wien

© 2016

Alle verwendeten Handelsnamen sind rechtlich geschützt.  
www.roche.at

Stand der Information: Jänner 2017  
AT Version 2.1 (RMP V15)

**Verwenden Sie das Abziehklebeetikett wie unten illustriert, um zu gewährleisten, dass dem Patienten die korrekte Darreichungsform und Stärke verabreicht wird**

**MabThera 1.400 mg Lösung zur subkutanen Injektion  
NUR ZUR ANWENDUNG bei NHL**



1. Auf der MabThera 1.400 mg Durchstechflasche befindet sich ein abziehbares Klebeetikett

2. Ziehen Sie das Klebeetikett ab

3. Kleben Sie das Klebeetikett auf die Spritze